

## ESTANDAR CLUB DEL MOSAICO

### HEMBRA MOSAICO LINEA MACHO

Las zonas de elección deben estar uniformemente pigmentadas (amarillo o rojo), serán intensas, luminosas y sin restos de nevadura. El resto del plumaje (lipocromo blanco), será de color “blanco tiza”, nítido y luminoso.

**Mascara Facial:** No debe ser ni muy corta ni muy amplia, aproximadamente 4 mm en la frente y unos 3 mm en el mentón, debiendo quedar los ojos en su interior y cortando perfectamente sin acusar lipocromo del ojo hacia la nuca. Será nítida, bien visible y coloreada, sin presentar falta de lipocromo en el centro de la frente.

**Hombros:** Serán amplios, algo mas que en las hembras línea hembra, bien delimitados, intensos y marcados en su zona de elección y sin restos de nevadura.

**Pecho:** Debe mostrar una ligera pero marcada coloración, bien separada de la máscara facial, flancos y bajo vientre. El bajo vientre debe ser muy blanco. Los flancos aparecerán sin presencia de lipocromo.

**Obispillo:** Bien delimitado, marcado y sin presencia de nevadura, permitiendo ser apreciado claramente, aun cuando el ejemplar permanezca con las alas cerradas. El lipocromo no debe afectar a la base de las rétrices, las cuales deben mostrarse totalmente blancas.

**Rémiges y rétrices:** Deben mostrarse totalmente blancas, sin ninguna presencia de lipocromo.

**Resto del plumaje:** (lipocromo blanco). De color blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún resto ni transparencias de lipocromo.

Evaluación	Descripciones	Puntos
<b>OPTIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zonas de elección descritas bien definidas, intensas y luminosas.</li><li>• Resto del plumaje (lipocromo blanco), que destaque perfectamente de las zonas de elección, de color blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún resto de pigmento ni transparencias.</li><li>• Rémiges y rétrices totalmente blancas.</li></ul>	<b>40</b>
<b>BUENO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascara y resto de zonas de elección algo mas pequeñas o mayores de lo óptimo, pero completas.</li><li>• Se tolera algo de coloración hacia la nuca.</li><li>• Ligerísimas transparencias de lipocromo en la espalda, cuello o flancos.</li><li>• Ligeros trazos nevados sobre el obispillo.</li><li>• Rémiges y rétrices blancas, tolerándose algún resto de lipocromo.</li></ul>	<b>Desde 39 Hasta 35</b>

REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara reducida, con frente rota y/o falta de lipocromo en el mentón, pero permitiendo definir la categoría “hembra línea macho”.</li> <li>• Mascara muy amplia y extendida en forma de bridas hacia la nuca.</li> <li>• Resto de zonas de elección reducidas o demasiado amplias.</li> <li>• Evidente presencia de lipocromo en cuello, dorso y flancos.</li> <li>• Acusada presencia de nevadura sobre los hombros y rabadilla.</li> <li>• Lipocromo blanco mate.</li> <li>• Rémiges y rétrices con acusada presencia de lipocromo.</li> </ul>	<p><b>Desde 34 Hasta 30</b></p>
MALO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara muy amplia o poco evidente, tendiendo a hembra línea hembra.</li> <li>• Resto de zonas de elección muy extendidas, tendiendo a la categoría nevado o bien muy reducidas (sin lipocromo en pecho).</li> <li>• Lipocromo blanco mate, apagado.</li> <li>• Rémiges y rétrices con fuerte carga de lipocromo.</li> </ul>	<p><b>Desde 29 hasta 25</b></p>

### **MACHO MOSAICO LINEA HEMBRA**

Las zonas de elección deben estar uniformemente pigmentadas, ser intensas, luminosas y sin restos de nevadura. El resto del plumaje de color “blanco tiza”, nítido y luminoso.

**Mascara Facial:** Debe tener una máscara tipo antifaz, corta en la frente, no mas de 3 mm. En la barbilla tendrá una mínima o la total ausencia de lipocromo. Estará extendida hacia atrás en línea recta desde el ojo hacia la nuca, sin llegar a esta.

**Hombros:** Serán bien delimitados, intensos y marcados, sin restos de nevadura. Menos amplios que los machos línea macho.


**Pecho:** debe mostrar un triángulo invertido hacia la zona del vientre, no tan bien coloreado como en los machos línea macho, bien separado de la máscara facial, flancos y bajo vientre. El bajo vientre debe ser muy blanco. Los flancos aparecerán sin presencia de lipocromo.

**Obispillo:** Bien delimitado, marcado y sin presencia de nevadura, permitiendo ser apreciado, aun cuando el ejemplar permanezca con las alas cerradas. El lipocromo no debe afectar a la base de las rétrices, las cuales deben mostrarse totalmente blancas.

**Rémiges y rétrices:** Deben mostrarse totalmente blancas, sin ninguna presencia de lipocromo.

**Resto del plumaje:** (lipocromo blanco). De color blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún resto ni transparencias de lipocromo.

Evaluación	Descripciones	Puntos
<b>OPTIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara tipo antifaz, con frente corta, no mas de 3 mm y sin resto de lipocromo en el mentón, bien prolongada hacia atrás en línea recta con el ojo, sin llegar a la nuca.</li> <li>• Resto de zonas de elección bien definidas, intensas y luminosas.</li> <li>• Resto del plumaje (lipocromo blanco), que destaque perfectamente de las zonas de elección, de color blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún resto de pigmento ni transparencias.</li> <li>• Rémiges y rétrices totalmente blancas.</li> </ul>	<b>40</b>
<b>BUENO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara tipo antifaz, aunque algo mas amplia o reducida de lo óptimo. Buena prolongación desde el ojo hacia atrás, siempre en línea recta.</li> <li>• Lipocromo blanco destacando perfectamente de las zonas de elección, de color blanco tiza, nítido y luminoso, tolerándose una ligera transparencia de lipocromo.</li> <li>• Ligeros trazos nevados sobre el obispillo.</li> <li>• Ligera coloración debajo del pico.</li> <li>• Rémiges y rétrices blancas, tolerándose restos de lipocromo</li> </ul>	<b>Desde 39 Hasta 35</b>
<b>REGULAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara con tendencia a macho línea macho y poco extendida hacia atrás o poco evidente.</li> <li>• Zonas de elección muy extendidas o muy reducidas, permitiendo definir la categoría.</li> <li>• Evidente presencia de lipocromo en cuello, dorso y flancos.</li> <li>• Lipocromo blanco mate.</li> <li>• Evidente presencia de nevadura sobre el obispillo, y sobre los hombros.</li> <li>• Rémiges y rétrices con acusada presencia de lipocromo.</li> </ul>	<b>Desde 34 Hasta 30</b>
<b>MALO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascara muy amplia o viceversa y poco extendida hacia atrás.</li> <li>• Zonas de elección muy extendidas tendiendo a la categoría nevado o viceversa.</li> <li>• Presencia lipocrómica en mejillas, cuello, nuca, flancos y muslos.</li> <li>• Lipocromo blanco mate, apagado.</li> <li>• Rémiges y rétrices con fuerte carga de lipocromo.</li> </ul>	<b>Desde 29 Hasta 25</b>



MACHO LINEA HEMBRA - HEMBRA LINEA HEMBRA